



Antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse (EI)

Chez qui l'antibioprophylaxie est-elle indiquée ?

UNIQUEMENT les patients les plus à risque de développer une EI :

- ◊ Porteurs d'une prothèse valvulaire (tous types)
- ◊ Ayant un antécédent d'endocardite infectieuse
- ◊ Porteurs d'une cardiopathie congénitale cyanogène non opérée ou opérée mais avec shunt résiduel
- ◊ Porteurs de pompe d'assistance ventriculaire

EN CAS DE DOUTE : contacter le cardiologue traitant

Pour quels types d'actes ?

UNIQUEMENT les actes invasifs à l'origine d'une bactériémie significative, en particulier :

Endodontie	Chirurgie orale
Pose d'une digue (gencive inflammatoire)	Toute avulsion dentaire (\pm alvéolectomie)
Pulpotomies, traitements et retraitements endodontiques sur dents permanentes immatures	Toute chirurgie osseuse sans utilisation d'une membrane de régénération osseuse
Chirurgie endodontique sans utilisation d'une membrane de régénération osseuse	Toute chirurgie muqueuse
Parodontologie	Toute chirurgie pré-, per- et post-implantaire sans utilisation d'une membrane de régénération osseuse
Détartrage (\pm surfaçage)	
Tout acte de chirurgie parodontale sans utilisation d'une membrane de régénération osseuse	Anesthésie locale en site inflammatoire

EN CAS DE DOUTE : une liste complète des actes figure dans les recommandations HAS 2024.

ATTENTION, ces actes invasifs sont contre-indiqués chez les patients à haut risque d'EI :

- ◊ Coiffage pulpaire en denture permanente mature
 - ◊ Pulpectomie des dents temporaires
- ◊ Toute technique de chirurgie avec utilisation d'une membrane de régénération osseuse
 - ◊ Tout traitement de la péri-implantite

Modalités de l'antibioprophylaxie

EXCLUSIVEMENT en prise orale unique dans l'heure précédant le geste opératoire :

Absence d'allergie à la pénicilline	Allergie avérée* à la pénicilline	
Amoxicilline	Azithromycine^A	Pristinamycine
Adultes : 2g Enfants : 50 mg/kg	Adultes : 500 mg Enfants : 15 mg/kg	OU Adultes : 1g Enfants : 25 mg/kg ^B

* antécédent d'anaphylaxie, angio-oedème ou urticaire après prise d'antibiotique de la famille de la pénicilline

A. Contre-indication formelle chez le patient traité pour ou ayant un allongement de l'intervalle QT

B. Contre-indication chez l'enfant de moins de 6 ans