

Vous participez à une étude nationale, cette newsletter vous concerne !



Étude PROPHEETS - Newsletter 3 - septembre 2024

## FAITS SAILLANTS

La prise en charge dentaire des patients à risque d'endocardite infectieuse est multidisciplinaire et complexe.

Le 12 avril dernier, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié « *Prise en charge bucco-dentaire des patients à risque d'endocardite infectieuse* » avec pour objectif de définir les patients à haut risque d'endocardite infectieuse et à risque intermédiaire, d'améliorer la prise en charge dentaire des patients à haut risque d'endocardite infectieuse sur la base d'une revue critique de la littérature qui a conduit à élargir le nombre de gestes invasifs autorisés (avec ou sans antibioprophylaxie) et à réduire les situations nécessitant des avulsions dentaires.

## NOUVEAUTES DES RECOMMANDATIONS HAS !

Les principales nouveautés de ces recommandations sont les suivantes :

- Les patients porteurs d'assistance ventriculaire font désormais partie du groupe des patients à haut risque de survenue d'endocardite infectieuse devant faire l'objet d'une antibioprophylaxie en cas de pratique d'un geste buccodentaire à risque.
- Une antiseptie pré-opératoire en bain de bouche pendant 1 min avant tout geste bucco-dentaire (invasif ou non) à la Chlorhexidine (0,12% ou 0,20%) chez l'ensemble des patients à risque est recommandée
- Les antibiotiques recommandés en cas d'indication d'une antibioprophylaxie et d'antécédent avéré d'allergie à la pénicilline ont été modifiées avec notamment l'abandon de la Clindamycine.
- De nombreux actes bucco-dentaires invasifs sont désormais autorisés avec antibioprophylaxie chez les patients à haut risque de survenue d'E.I. en respectant des conditions optimales d'asepsie et techniques : implantologie, chirurgie orale et parodontale, traitements et retraitements endodontiques, gestes d'odontologie pédiatrique et d'orthodontie

Pour connaître en détail les actes invasifs nécessitant une antibioprophylaxie ou les actes contre indiqués pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, consultez les **recommandations HAS**.

Vous pouvez vous référer à notre [outil d'aide à la prescription en ligne ICI](#)

Vous pouvez retrouver dans le kit PROPHETS reçu par voie postale deux documents qui synthétisent les recommandations HAS : la réglette et la fiche synthèse A4.

The image displays two documents related to the 2024 HAS guidelines for Antibio prophylaxie de l'endocardite infectieuse (EI).

**Document 1: Règlette (Ruler)**

This document is a ruler with a scale from 0 to 20 cm. It contains the following sections:

- Antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse (EI)**
  - L'antibioprophylaxie est indiquée chez :**
    - Porteurs d'une prothèse valvulaire (sous type)
    - Porteurs d'une cardiopathie congénitale (cardiopathie non opérée ou opérée mais avec résidu résiduel)
    - Porteurs de pompe d'assistance ventriculaire
  - Actes autorisés avec antibioprophylaxie**
    - Endodontie**
      - Pour d'une digue (gencive inflammatoire)
      - Pulvérisation, scellement et restauration des dentures dentaires temporaires
      - Chirurgie endodontique sans utilisation d'une anesthésie de régénération osseuse
    - Parodontologie**
      - Chirurgie (à l'exception de la chirurgie de la parodontite)
  - Chirurgie orale**
    - Tous les actes dentaires (à l'exception de la chirurgie de la parodontite)
    - Tous les actes dentaires (à l'exception de la chirurgie de la parodontite)
    - Tous les actes dentaires (à l'exception de la chirurgie de la parodontite)
  - Modèles de l'antibioprophylaxie**
    - Amoxicilline en prise orale unique 1h avant le geste :**
      - Adultes : 3g
      - Enfants : 50 mg/kg
    - En cas d'allergie à la pénicilline :**
      - Antismycomycine**
        - Adultes : 500 mg
        - Enfants : 15 mg/kg
      - Prénaloxone**
        - Adultes : 1g
        - Enfants : 25 mg/kg
    - Actes contre-indiqués (liste exhaustive) :**
      - Collage adhésif des dentures temporaires
      - Pulvérisation des dents temporaires
      - Tous les actes de chirurgie de la parodontite
      - Tous les actes de chirurgie de la parodontite

**Document 2: Fiche synthèse A4**

This document is a summary sheet for Antibio prophylaxie de l'endocardite infectieuse (EI). It contains the following sections:

- Qu'est-ce que l'antibioprophylaxie ?**
  - Elle consiste à prévenir la survenue d'une endocardite infectieuse (EI) chez les patients à haut risque de survenue d'E.I.
  - Elle est indiquée chez les patients à haut risque de survenue d'E.I. (porteurs d'une prothèse valvulaire, porteurs d'une cardiopathie congénitale, porteurs de pompe d'assistance ventriculaire).
  - Elle est contre-indiquée chez les patients à faible risque de survenue d'E.I. (porteurs d'une prothèse valvulaire, porteurs d'une cardiopathie congénitale, porteurs de pompe d'assistance ventriculaire).
- Pour quels types d'actes ?**
  - Les actes à haut risque de survenue d'E.I. sont les suivants :
  - Les actes à faible risque de survenue d'E.I. sont les suivants :
- Modèles de l'antibioprophylaxie**
  - Amoxicilline en prise orale unique 1h avant le geste :**
    - Adultes : 3g
    - Enfants : 50 mg/kg
  - En cas d'allergie à la pénicilline :**
    - Antismycomycine**
      - Adultes : 500 mg
      - Enfants : 15 mg/kg
    - Prénaloxone**
      - Adultes : 1g
      - Enfants : 25 mg/kg
  - Actes contre-indiqués (liste exhaustive) :**
    - Collage adhésif des dentures temporaires
    - Pulvérisation des dents temporaires
    - Tous les actes de chirurgie de la parodontite
    - Tous les actes de chirurgie de la parodontite



La dose d’Azithromycine chez l’enfant en cas d’allergie a été modifiée passant de 15mg/kg à 20mg/kg



Suivez les newsletters de PROPHETS !.

La prochaine paraîtra le 3 octobre :

« *Identifier les patients à risque* ».

[\[Désinscription\]](#)